Fractura bilateral traumática de espina acromial

Dr. Alexis Fernández (Arg)

Objetivo/Hipótesis

El objetivo de este trabajo es presentar el caso de una fractura bilateral traumática de espina escapular.

Nivel de Evidencia IV

Materiales y método

Paciente con fracturas bilaterales de escápula oblicuas cortas casi idénticas causadas por traumatismo compresivo por equino (fig. 1). Se implantó un tornillo de 3,5 mm cortical compresivo y una placa bloqueada en función de neutralización en cada fractura. En la espina izquierda se utilizó una placa de reconstrucción y en la derecha una placa LCP (Fig 2 y 3).

Resultados

La consolidación ósea se alcanzó a las 8 semanas en la escápula derecha y a las 10 semanas en la izquierda. La placa LCP fue retirada luego de 11 meses por dolor persistente. No impidió una adecuada rehabilitación. Se alcanzaron 135 grados de flexión anterior, 120 grados de abducción y rotaciones completas de hombro a los 15 meses de seguimiento (fig 4)

Consideraciones Finales.

No se registran casos de fracturas bilaterales de espina escapular en la bibliografía.

Se reportan hasta un 20% de retiro de material por irritación del implante¹.

Se registra un porcentaje considerable de consolidación parcial, pero clínicamente no se ve representada².

Fig 1. TAC 3D con fracturas de espina escapular bilateral

Fig 2. Imagen quirúrgica de la placa LCP

Fig 3. Rx postoperatorias.

Fig 4. Imágenes clínicas de la movilidad post-operatoria alcanzada.